

# Choroby trávicí soustavy člověka

**Záněty dutiny ústní**, opary, afty; **Opary** – způsobuje vir herpes simplex, nakažlivé

**Zubní kaz** – špatná hygiena, také geneticky vrozené, narušení skloviny; nejběžnější nemoc na světě

**Paradentóza** – uvolňování zdravých zubů, onemocnění dásní

**Zubní kámen** – ze solí

## **Apendicitida**

Zánět apendixu (červovitého přívěsku slepého střeva) způsobující náhlou bolest břicha a vyžadující odstranění apendixu.

## **Cirhóza**

Vážné, často i smrtelné poškození jater. Je způsobeno vazivovými jizvami uvnitř jater, vzniklými následkem alkoholismu nebo hepatitidy (zánětu jater).

## **Dyzenterie**

Krvavý průjem, způsobený těžkou střevní infekcí.

## **Gastroenteritida**

Zánět žaludku a střeva s průjmem a zvracením.

## **Hepatitisida**

Zánět jater způsobený nejčastěji virovou infekcí nebo poruchou imunity (automunitní hepatitisida)

- Typ A – infekční žloutenka, inkubační doba 14-50 dní, projevy chřipky, tmavá moč, světlá stolice, svědění kůže, zvětšení jater, nemoc 2-4 týdny, pobyt na lůžku, dieta, bez trvalých následků, zdrojem nákazy infikovaný člověk, prevence mytí rukou a očkování
- Typ B – sérová žloutenka, 100 krát nakažlivější než HIV, inkubační doba 50-180 dní, končí cirhózou i rakovinou, přenos krví, spermatem a poševním sekretem, nákaza v nemocnici, narkomani, přenos z matky na novorozence
- Typ C – inkubační doba 2 týdny až 6 měsíců, nákaza krví a při sexu, podobné jako typ B

**Rakovina tlustého střeva** – možnost včas odstranit

**Rakovina dalších částí trávicích cest** – hltan, jícen, žaludek, konečník, játra

## **Průjem**

Časté vyprazdňování velmi řídké stolice, většinou následkem otravy z jídla nebo požitím znečištěné vody. salmonelóza

## **Syndrom dráždivého tračníku**

Nepravidelné záchvaty bolestí břicha, průjmu nebo zácpy bez známé příčiny.

## **Trávicí potíže**

Nevolnost v oblasti žaludku, způsobená přijetím příliš velkého množství potravy nebo příliš rychlým přijímáním potravy.

## **Vředy**

Bolestivá poškození sliznice trávicí trubice, hlavně žaludku, dvanáctníku a lačnicku, způsobená natrávením kyselou žaludeční šťávou. Antibiotiky jsou léčeny v případě bakteriální etiopatogeneze. Např. vřed dvanáctníku (ulcus bulbi duodenalis) je téměř ve 100 % vyvolán bakterií *Helicobacter pylori*.

## **Zácpa**

Nepravidelné, často bolestivé vyprazdňování tvrdé stolice. Příčiny - nedostatek pohybu, potlačování defekace, špatná psychika

## **Zhoubná anémie**

Druh anémie při níž je nedostatek červených krvinek, způsobený nedostatečným vstřebáváním vitamínu B<sub>12</sub> ve střevě.

**Žlučové kameny** – vysrážení žluči, ucpání žlučových cest

Zdroj: <http://www.sesity.net/biologie/travici-soustava.php>